

CHAPITRE IX : La croûte terrestre


Leçon 23 : Le contraste pétrographique océan/continent

Roches continentales

- Un peu de roches sédimentaires (2 km / 35 km)
- Beaucoup de granites
= magmatique, grenue



Granite




Calcaire

- Densité = 2,7

Identification des minéraux à l'œil nu

- **Couleur** (blanc, gris, noir, rouge, vert, etc.)
- **Transparence** (translucide ou opaque)
- **Éclat** (brillant ou mat, "métallique", "gras")
- **Forme** (prismatique, globuleux, en plaquettes, en paillettes, etc.)



Composition du granite

Feldspath

- Feldspath (plagioclase et orthose)
- Quartz
- Mica noir



Quartz




Biotite (= mica noir)

- **Silicium (33 %)**
- Aluminium (8 %)
- Métaux alcalins Na, **K** (6 %)

Roches océaniques

Gabbro

- Magmatiques, même composition
- Gabbro texture grenue
- Basalte texture microlitique




Basalte

- Densité = 3,0

Croute océanique

- En moyenne environ 6 km d'épaisseur
- Gabbros plutoniques, refroidissement lent
- Basaltes volcaniques, refroidissement rapide (laves)



Composition basalte et gabbro

- Feldspath (toujours plagioclase, jamais orthose)
- Pyroxène
- Olivine (parfois)
- Amphibole (parfois, moins brillantes que les pyroxènes)



Pyroxène




Olivine

- **Silicium (23 %)**
- Aluminium (8 %)
 - Calcium (7 %)
 - **Fer (7 %)**
- **Magnésium (5 %)**

Roche du manteau


- Péridotite, trouvée sous forme d'enclaves (ou nodules)
- Roche métamorphique
- Densité = 3,3



Composition de la péridotite

- Olivine (vert-jaune) et Pyroxène (Clinopyroxène = vert foncé, Orthopyroxène = brun)

Péridotite



- **Silicium (21 %)**
- **Magnésium (21 %)**
 - **Fer (7 %)**
- Très peu de métaux alcalins Na, **K**, très peu de calcium, et d'aluminium

Densités

- Croute continentale = 2,7
- Croute océanique = 3
- Manteau sous la croute = 3,3
- Vérification ?

